

Träff med floragruppen på Prästberget 2013-07-06

Lördagen den 6/7 träffades delar av Floragruppen, Åsa Tidestav, Siw Karre-Boll, Ragnhild Karlsson, Volker Petersen och Håkan Nihlman vid järnvägsundergången norr om Kalmarsand (sydöstra Bålsta) för att undersöka i Artportalen rapporterade växtplatser för knärot, blåmunkar och plattlumner vid Prästberget. Av nämnda växter återfanns bara ett bestånd av **blåmunk** *Jasione montana* (135 st. individer) på Prästbergets västsluttning.



Blåmunkar som växte på Prästbergets sydvästsida



Åsa Tidestav och Volker Petersen räknar blåmunkar



Siw Karre-Boll och Ragnhild Karlsson räknar blåmunkar

Blåmunkar är en tvåårig ört som tillhör familjen klockväxter och Uppland utgör nordgränsen för dess utbredning i Sverige. Växten är mycket känslig för konkurrens och finns påträffas vanligen på sandig och mager mark.

Sedan Prästberget avspanats klart så begav sig gruppen ned till Lillsjön där vi bl.a. kunde avnjuta ett bestånd av **tibast** med dess klarröda bär och två bestånd med **nästrot** vid stranden av sjön. Både den sydöstra och den sydvästra stranden av sjön hyste bestånd av nästrot.



Tibast



Nästrot vid Lillsjöns strand

Tibast *Daphne mezereum* är en buske som kan bli uppemot 1,5 meter hög och blommar med rosa blommor, vanligen under april månad, på bar kvist. De röda bären kommer tidigt på sommaren och är extremt giftiga för oss människor. Om bär förtärs av en människa orsakar det en brännande smärta i munnen och i halsen, blåsor och salivavsöndring. Att äta 12 st. bär kan leda till dödsfall. **Nästrot** *Neottia nidus-avis* tillhör familjen orkidéer, men till skillnad från flertalet av sina släktingar så saknar den klorofyll. Den tar sin näring från marken genom att parasitera på mykorrhizasvampar och gör verkligen skäl för sitt namn eftersom roten liknar ett trassligt fågelbo.

Håkan Nihlman